Unioeste

Diretoria de Concursos

Concurso Público
para o Provimento de Cargos Públicos para Atuação no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP)

PROVA OBJETIVA

Técnico de Enfermagem

Instruções para a Prova

- Para a realização desta prova de 30 questões, você deve ler e reler cada questão, podendo fazer anotações e cálculos neste caderno mesmo, conforme melhor lhe convenha.
- Não basta fazer anotações e resolver a questão neste caderno. É indispensável transferir a resposta (A, B, C, D ou E) para a folha de respostas. Assinalar as respostas das questões na folha de respostas cabe exclusivamente a você, e deve ser feito dentro do horário da prova.
- Leia atentamente a proposição inicial de cada questão. Nela está delimitado o assunto abrangido. Uma vez percebido qual é, especificamente, o assunto que está sendo questionado, leia as alternativas apresentadas, ou seja, o que está escrito após as letras A, B, C, D e E. Escolha a alternativa mais correta em relação à proposição inicial. Se duas ou mais alternativas lhe parecem corretas, confira mais uma vez qual delas está mais correta e abrangente em relação à proposição inicial. É permitido lançar apenas uma resposta para cada questão.

  Atenção: *Caso duas ou mais alternativas estejam corretas e isto constar de uma alternativa seguinte, então a única resposta correta é a alternativa seguinte, a mais abrangente.*

- A interpretação das questões faz parte da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais durante a prova. Na dúvida, não deixe de lançar uma resposta na folha de respostas (lance uma resposta, a que mais lhe pareça correta em relação à proposição inicial da questão).
- Caso você encontre uma questão que lhe pareça errada ou com defeito, pare e reflita. Primeiro: Provavelmente a questão está certa. Segundo: Mesmo que haja erro ou defeito, nada pode ser feito durante o horário da prova. Reclamar ao fiscal é perda de tempo. A única providência produtiva sua será, após o horário da prova, hoje ou amanhã, dirigir-se à Reitoria da Unioeste, e fazer por escrito a sua reclamação. A Comissão de Concurso, diante da sua reclamação por escrito, tomará providências para que ninguém seja prejudicado no concurso por motivo de erro ou defeito na prova. Além disso, os gabaritos serão colocados à discussão pública antes de serem tornados definitivos.
- Na hipótese de falha na impressão do caderno de prova ou da folha de respostas, peça ao fiscal que substitua o seu material por outro sem defeitos de impressão.
- Não há substituição de folha de respostas se você cometer erros ou fizer rasuras. Por isso, preste atenção antes de começar a preencher as respostas.
- No horário destinado à prova (9.00 às 12.00 horas) está incluída a identificação dos candidatos pelos fiscais, a distribuição dos cadernos de provas e a marcação da folha de respostas. Ninguém pode ficar além do horário para preencher folha de respostas.
- Na folha de respostas, atente para as instruções sobre como lançar corretamente as respostas das questões, sob pena de sofrer prejuízo automático na leitura ótica.

Prova de Conhecimentos Específicos

01. Quando é realizada uma verificação de pressão arterial em um paciente idoso, esta deverá ser verificada com o paciente na posição:

(A) deitada.
(B) sentada.
(C) deitada e sentada.
(D) deitada, sentada e de pé.
(E) A posição do paciente na qual será realizada a mensuração não interfere no resultado final.

---

02. Um paciente foi admitido com pneumonia bacteriana e se apresenta febril, diaforético e dispnéico, e com história de asma. Com base nestes dados, o cuidado de enfermagem mais importante a ser considerado é:

(A) manter a oxigenação adequada.
(B) prevenir o excesso de volume de líquidos.
(C) providenciar medidas para a redução da dor.
(D) orientar quanto aos cuidados quanto à asma.
(E) Nenhuma das afirmativas anteriores está correta.

---

03. Qual dos seguintes termos é o apropriado para descrever um aumento do número de células em um órgão ou tecido?

(A) Atrofia.
(B) Hipertrofia.
(C) Hiperplasia.
(D) Metaplasia.
(E) Distrofia.

---

04. Ao administrar uma solução endovenosa de eletrólitos, quais precauções devem ser tomadas?

(A) Infundir as soluções de forma rápida.
(B) Não ministrar mais que 80 mEQ de potássio por litro de fluido.
(C) Prevenir infiltração de cálcio, o que irá causar necrose de tecido e formação de crostas.
(D) Verificar se o paciente está recebendo digitálico, pois o cálcio EV diminui a ação do digitálico.
(E) As afirmativas A e B estão corretas

---

05. Um dia após redução aberta e fixação interna de quadril esquerdo, e diante da queixa de dor do paciente, quais dos seguintes dados deverão ser relatados para o médico, em vez de se administrar medicação para dor, se houver prescrição desta?

(A) Curativo do quadril esquerdo seco e intacto.
(B) PA 114/78, freqüência cardíaca de 82.

(C) MIE em posição anatômica e funcional.
(D) Pé esquerdo frio ao toque, pulso pedioso impalpável.
(E) Havendo medicação prescrita para dor, na há necessidade de comunicar o médico da queixa do paciente.

---

06. Qual das afirmativas abaixo está correta?

(A) Dor intratável pode ser aliviada pelo tratamento.
(B) A dor é um sinal objetivo que indica um problema sério.
(C) Os fatores psicológicos raramente contribuem para a percepção de dor pelo paciente.
(D) A sensação de dor é afetada pela antecipação da dor pelo cliente.
(E) Por ser um sinal subjetivo, a queixa nem sempre deve ser levada a sério.

---

07. A prescrição de enfermagem mais comumente exigida no cuidado de um paciente com DPOC, e que está em um quadro de insuficiência respiratória, é:

(A) estabelecer um estágio inicial de atividade.
(B) desencorajar o paciente para manter-se na posição de Fowler, uma vez que esta aumenta o trabalho cardíaco.
(C) remover as secreções brônquicas e promover a oxigenoterapia.
(D) administrar medicamento broncodilatador.
(E) Como o quadro apresentado é crônico, a insuficiência respiratória deverá passar espontaneamente.

---

08. Uma complicação potencial da aspiração traqueobrônquica é o colapso lobar. Isto pode ser evitado pela:

(A) utilização de um cateter de grande calibre, com o mesmo diâmetro da traquéia.
(B) aplicação de aspiração a uma alta pressão para realizar o procedimento o mais rápido possível.
(C) aplicação da ventilação por 30 segundos ou mais.
(D) utilização de um cateter estreito o bastante para não ocluir a via aérea durante a realização da aspiração.
(E) Nenhuma das afirmativas acima está correta.

---

09. O cuidado de enfermagem para o paciente em SARA incluiria:

(A) manter o paciente em pronação.
(B) observar o paciente quanto ao déficit de líquido.
(C) monitorar os níveis de gasometria arterial e o estado cardíaco.
(D) administrar oxigênio a um fluxo de 3 l/min por cânula nasal.
(E) As alternativas A e D estão corretas.

---

10. O cuidado de enfermagem prioritário para um paciente vivenciando um edema pulmonar grave é:

(A) chamar um médico.
(B) examinar a permeabilidade da via aérea e administrar oxigênio via máscara facial.
(C) solicitar vaga em uma Unidade de Terapia Intensiva.
(D) colocar o paciente em posição de Fowler e administrar oxigênio.
(E) solicitar que alguém chame o médico, colocar o paciente em posição de Fowler, instalar oxigenioterapia e providenciar material de urgência.

---

11. Qual das seguintes ações de enfermagem demonstram a compreensão de uma das complicações básicas da peritonite?

(A) oferece refeições freqüentes e pequenas.
(B) observação freqüente do estado respiratório.
(C) observação regular da integridade cutânea.
(D) avaliação da consistência e coloração das fezes.
(E) Nenhuma das afirmativas acima está correta

---

12. Os cuidados pré-operatórios para um paciente recebendo terapia com glicocorticóide a longo prazo devem incluir:

(A) suspender o glicocorticóide porque o paciente está em jejum.
(B) avisar ao médico sobre a medicação usual do paciente e administrar uma dose elevada parenteralmente após prescrição médica.
(C) avisar ao médico sobre a medicação usual do paciente e administrar a dose usual por via intramuscular após prescrição médica.
(D) administrar a dose usual com uma pequena quantidade de água.
(E) não administrar a medicação e avisar o centro cirúrgico.

---

13. Os sinais vitais da criança indicam o funcionamento dos sistemas orgânicos mais importantes para a manutenção da vida. Assim a técnica de verificação deve atentar para alguns pontos, exceto:

(A) A respiração no lactente é abdominal ou diafragmática – após os sete anos predomina a torácica.
(B) A respiração da criança deve ser verificada após a avaliação dos outros sinais.
(C) Os registros do pulso devem avaliar a freqüência, ritmo, força da batida, alterações e fatores associados.
(D) A temperatura deve ser vista de preferência com a criança calma em repouso por pelo menos meia hora, e uma hora após o almoço, pois a digestão aumenta a temperatura.
(E) A pressão arterial na criança não é feita de rotina – é verificada somente nas crianças com patologia.

---

14. Um banho com espoja úmida e tépida para diminuir uma elevada temperatura corporal central auxilia a pele em sua função de termorregulação por qual princípio?

(A) Radiação.
(B) Condução.

(C) Convecção.
(D) Dissipação.
(E) Esse procedimento não demonstra eficácia.

---

15. Ao monitorizar um paciente que sofreu um forte impacto sobre a cabeça, para a verificação dos sinais de elevação da PIC, deve-se manter particularmente alerta para:

(A) alterações pupilares.
(B) dificuldade em acordar o paciente.
(C) diminuição da PA.
(D) elevação da temperatura.
(E) diminuição da temperatura.

---

16. As ações apropriadas para o atendimento de um paciente acometido de convulsão tônico-clônica incluiriam:

(A) colocar uma espátula de madeira entre os dentes do paciente.
(B) elevar a cabeça.
(C) proteger a cabeça e as extremidades do contato com outros objetos.
(D) conter braços e pernas.
(E) esperar passivamente a regressão da crise.

---

17. Após a reposição total de quadril direito, o MID deve ser mantido na posição correta através de:

(A) colocação de um calço abdutor ou um travesseiro entre as pernas.
(B) colocação de sacos de areia ou travesseiros para manter a perna aduzida.
(C) elevação da perna afetada em dois travesseiros ou suportes.
(D) posicionamento do paciente em supina e sobre o lado operado.
(E) Como a reposição já foi realizada, não importa a posição do paciente.

---

18. O cuidado de enfermagem para uma temperatura corporal elevada secundária a um processo infeccioso incluiria:

(A) compressas úmidas com água fria no corpo do paciente.
(B) encorajar a diminuição da ingesta hídrica.
(C) administrar medicamentos antipiréticos prescritos.
(D) colocar roupas pesadas e restritivas.
(E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

---

19. Qual das seguintes afirmações está correta?

(A) As alterações fisiológicas relacionadas à idade são diferentes daquelas que refletem a doença.
(B) A taxa de envelhecimento é consistente quanto a vários sistemas orgânicos.

(C) Um estereótipo de declínio progressivo físico e mental está associado com o envelhecimento.
(D) Os efeitos do desuso e descondicionamento físico causado pela inatividade do adulto idoso são geralmente irreversíveis.
(E) Todas as afirmativas anteriores estão corretas.

---

20. Qual, dentre as afirmativas abaixo, está correta em relação aos cuidados de enfermagem a um paciente em tração esquelética pós-fratura de fêmur?

(A) remoção da tração a cada 2 horas e mudança de decúbito para a posição de pronação.
(B) avaliação dos locais dos pinos quanto a sinais de irritação e infecção.
(C) não utilizar uma tábua rígida sob o colchão do cliente.
(D) limpar os locais dos pinos com tintura de benzoína.
(E) Todas as afirmativas anteriores estão corretas.

---

21. São consideradas substâncias anti-sépticas:

(A) substancia ou produto capaz de destruir todas as formas de microorganismos, inclusive as esporuladas.
(B) substância ou produto capaz de destruir fungos.
(C) substância pouco irritante, utilizada em pele e mucosas, objetivando impedir ou dificultar o crescimento de microorganismos patogênicos.
(D) substâncias capazes de desengordurar a pele.
(E) Nenhuma das afirmativas acima está correta.

---

22. O fator mais importante na prevenção da disseminação de um microorganismo é:

(A) utilização da técnica correta da lavagem de mãos.
(B) manutenção da técnica asséptica na inserção de cateter de demora.
(C) vestimenta de máscaras, capotes e luvas ao cuidar de pacientes com diagnóstico de AIDS.
(D) limpeza de gotas de sangue com hipoclorito de sódio.
(E) Todas as afirmativas anteriores estão corretas.

---

23. Na heparinização de um cateter utiliza-se:

(A) 1,0 ml de heparina sódica, com aplicação deste volume total.
(B) 1,0 ml de heparina sódica e 9,0 ml de água destilada, com aplicação de 1,0 ml desta solução.
(C) 2,0 ml de heparina sódica e 8,0 ml de água destilada, com aplicação de 1,0 ml desta solução.
(D) ml de heparina sódica e 9,9 ml de água destilada, com aplicação de 1,0 ml desta solução.
(E) 1,0 ml de heparina sódica e 10 ml de água destilada, com aplicação de 0,5 ml desta solução.

---

24. Constituem cuidados de enfermagem relacionados à administração de medicação:

(A) não administrar digitálicos se a freqüência de pulso estiver menor que 60 bpm.
(B) broncodilatodores devem ser administrados de forma rápida.
(C) observar sinais ou queixas de sangramento antes de administrar medicações anticoagulantes.
(D) As afirmativas A e B estão corretas.
(E) As afirmativas A e C estão corretas.

---

25. Quanto à restrição de pacientes, é certo afirmar:

(A) Todo paciente agitado deve ser contido, independente de seu grau de consciência.
(B) As restrições somente deverão ser utilizadas quando houver necessidade da garantia da segurança do paciente, após uma avaliação criteriosa.
(C) Pacientes idosos, obesos, inconscientes, desorientados, devido à grande incidência de quedas, deverão sempre ser mantidos restringidos utilizando, para isso, faixas contensoras.
(D) A contenção de membros superiores e inferiores de pacientes exigirá uma maior observação por parte da enfermagem, uma vez pode causar ferimentos por fricção e diminuição da circulação, além de exacerbarem a ansiedade.
(E) As afirmativas B e D estão corretas.

---

26. A icterícia, devido à incompatibilidade Rh, geralmente aparece:

(A) no primeiro mês.
(B) no terceiro ou quarto dia.
(C) após as primeiras 2 horas.
(D) vinte e quatro horas após o parto.
(E) ao nascimento.

---

27. Ao atender uma mulher gestante na sala de admissão da maternidade, devem ser avaliados os seguintes sinais. EXCETO:

(A) Sinal de contração uterina ritmada.
(B) Data provável do parto.
(C) Perda do tampão mucoso.
(D) Perda de líquido ou sangue via baixa.
(E) Dor no baixo ventre.

---

28. As contrações são de suma importância no trabalho de parto. Assim, qual das respostas não é verdadeira?

(A) Durante as contrações, diminui o fluxo sanguíneo das artérias uterinas.
(B) As características das contrações do trabalho de parto incluem a freqüência, a duração e a intensidade.
(C) As contrações uterinas produzem o apagamento e a dilatação cervical, fazem o feto rodar e desprendem a placenta.

(D) As contrações são as forças do trabalho de parto e são voluntárias e intermitentes.
(E) As contrações, quando se tornam mais freqüentes e prolongadas, o decréscimo pode ser cumulativo e compromete o feto.

---

29. Dentro da assistência humanizada para a mulher em trabalho de parto, qual dos itens abaixo não deve ser realizado:

(A) Incentivá-la a deambular.
(B) Ficar em jejum.
(C) Oferecer líquidos denominados brancos.
(D) Incentivar o banho terapêutico.
(E) Deitar em decúbito lateral esquerdo.

---

30. Quanto ao puerpério, marque qual a resposta INCORRETA:

(A) O puerpério é dividido em imediato (até o décimo dia), remoto (do décimo dia ao 40º) e tardio (até cessar a amamentação).
(B) Na primeira hora os sinais vitais devem ser visto a cada quinze minutos.
(C) O útero deve regredir um centímetro ao dia até o décimo dia, passando assim a ser um órgão pélvico.
(D) A deambulação deve ser iniciada o mais precocemente após o parto.
(E) Quando ocorre atonia uterina, devemos fazer massagens e ou usar sacos de areia sobre o abdômen.